

中华蟾蜍 *Bufo gargarizans* Cantor, 1842

体型肥大；皮肤非常粗糙，背面密布圆形瘰疣；体色变异较大，背部多为橄榄黄色或灰棕色，腹部灰黄色或浅黄色，有深褐色云斑。常见于路边、陆地草丛、石块下或土穴等潮湿环境；繁殖期间雄蛙常发出“咕，咕，咕”的连续鸣声，雌性产卵于静水塘浅水区，卵带缠绕在水草上。



©卢宸祺

黑眶蟾蜍 *Duttaphrynus melanostictus* (Schneider, 1799)

体型肥大，通常雌性更大；皮肤粗糙，密布疣粒；背部一般为黄棕或黑棕色，部分个体具棕红色斑；腹面乳黄色，有花斑；头顶外侧和眼眶均有黑色嵴棱。

行动笨拙，多爬行，非繁殖期营陆栖生活，常活动于草丛、耕地及住宅附近，繁殖季节成蟾返回水域及附近寻找配偶，期间雄性会发出似小鸭叫（呱，呱，呱）的鸣声。



©卢宸祺

东川白环蛇 *Lycodon synaptor* Vogel and David, 2010

我不是银环蛇！

但仍建议您保持安全距离

中等大小无毒蛇；体背黑色，具30-31条白色环纹。

该蛇系2010年国外学者依据采自昆明东川的标本所描述的新种，目前关于该蛇的生物学信息所知甚少，有待进一步调查和研究。



©卢宸祺

多疣狭口蛙 *Kaloula verrucosa* Boulenger, 1904

体型中等，肥胖；生活时背面橄榄绿色或灰棕色，散有大小数量不等的黑点；背部表面粗糙，密布疣粒。

当触碰该蛙时，其四肢伸直，身体膨胀似球状；大雨后的下午或晚间均可听到雄蛙“姆阿，姆阿…”的鸣声，雌蛙常将卵产于水塘内，卵单粒漂浮于水面。



©卢宸祺

云南小狭口蛙 *Glyphoglossus yunnanensis* (Boulenger, 1919)

体型肥胖，呈三角形；背面多为灰黄色或棕黄色，其上有镶以米黄色细边的深棕色对称斑纹；胯部有一对醒目的圆斑点。

常密集出现在大雨后的夜间，成蛙四肢舒展，静浮于水面之上；繁殖期间雄蛙发出“哇，哇”的鸣声，卵群呈单行或片状黏于水草或水中的落叶枯枝上，与多疣狭口蛙的漂浮性卵极不相同。




©卢宸祺

黑眉锦蛇 *Elaphe taeniura* (Cope, 1861)

大型无毒蛇，成年个体全长可达2米以上；体前中段具黑色梯状或蝶状斑纹，至后段逐渐消失，代之以黑色纵线延伸至尾末；眼后具明显粗黑眉纹，因此特征而得名。

行动迅速，善攀爬，性凶猛，受惊扰时常昂起头颈作攻击之势；食物以鼠类、鸟类及蛙类为主。



©卢宸祺

滇蛙 *Nidirana pleuraden* (Boulenger, 1904)

体型中等大小；背面通常为橄榄绿色或略带黄色，体背面有小而密集的褐色斑点，背中有浅黄色脊纹从鼻孔之间向后达尾基部；腹面浅黄色无任何斑点。

主要生活于洼地、沼泽或长有杂草的水塘，白天常伏于草丛中，多数仅露出头部，受惊扰后立即潜入水中；昼夜均可听到其鸣声，音量大而粗浊，似“缸、缸”声。



©卢宸祺

紫灰锦蛇 *Oreocryptophis porphyraceus* (Cantor, 1839)

中等大小的无毒蛇；通体背面呈绛红色，头背有黑色粗纵纹3条，体背具若干近乎等距排列的马鞍形斑，色斑中央略呈红褐色，外缘镶黑色边，体后段可见黑色纵纹延伸至尾末。

该蛇在国内分布较为广泛，南方多省多有分布，食物以鼠类等小型哺乳动物为主。



©卢宸祺

八线腹链蛇 *Hebius octolineatus* (Boulenger, 1904)

中等大小的无毒蛇；头背暗褐色，呈椭圆形；体尾色斑变异较大，多为黄褐色，伴有深浅相间的8条黑褐色纵纹，常具腹链，因此特征得名。

常见于各类型静水水域及附近湿地，为昆明地区常见种，食物以鱼、蛙为主。



©卢宸祺

无指臭蛙 *Odorrana grahami* (Boulenger, 1917)

体型较大而扁平；背部皮肤光滑，体背面呈棕褐色，散有不规则绿色斑纹或连接成片，有的散布有黑色圆斑；四肢通常有横纹。

常隐伏于石隙或水边草丛；臭蛙物种被捕捉时大多会分泌难闻且具刺激性的黏液，若接触伤口会产生刺痛感，对其他蛙类可致命。



©于中冠

颈棱蛇 *Pseudoagkistrodon rudis* Boulenger, 1906

中等大小的无毒蛇，体型短粗；头背黑褐色，略呈三角形；体尾背面黄褐色，散布有若干近方形或椭圆形的黑褐色大斑块。食物以蛙、蟾蜍为主，偶见捕食蜥蜴。

受惊时，颈部肌肉收缩，颌骨向两侧扩张，使头膨扁呈明显的三角形，加之体背色斑特点，常被误认为蝮蛇，因此又有“伪蝮蛇”之称。



©卢宸祺

王锦蛇 *Elaphe carinata* (Gunther, 1864)

大型无毒蛇，成年个体全长可达2米以上；个体间色斑变异较大，头背有似“王”字黑线；幼体与成体色斑极为不同，呈浅藕褐色，体背、中部具若干深褐色横纹，至体后变为散布的黑斑。

行动迅速而凶猛，食性广而贪食，以鸟类（包括鸟蛋）、蛇类及小型哺乳动物为食。



©卢宸祺